



HEALTHY TRAVEL PRO

Reisemedizinische Empfehlungen für Gesundheitsfachkräfte

www.healthytravel.ch

WAS WIR ANBIETEN

HealthyTravel.ch bietet grundlegende reisemedizinische Empfehlungen für Laien. Als Gesundheitsfachperson erhalten Sie Zugang zu einer kostenpflichtigen Website, auf der Sie von vertieften länderspezifischen Informationen, Impfpfehlungen, detaillierten Karten (einschliesslich Malariaempfehlungen), Merkblättern, Standardarbeitsanweisungen (SOP) für Impfungen und anderen wichtigen reisemedizinischen Inhalten profitieren, die Sie für die Beratung nutzen können. Alle Informationen lassen sich individuell zusammenstellen, mit Lesezeichen versehen und als Bericht ausdrucken oder elektronisch an Ihre Kunden versenden.

Die Empfehlungen und Inhalte auf der Website entsprechen den Empfehlungen der Schweizerischen Expertenkommission für Reisemedizin (EKRM) - einem Organ der Schweizerischen Fachgesellschaft für Tropen- und Reisemedizin (FMH). Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbeitet. Bitte beachten Sie, dass alle auf der Website HealthyTravel.ch verfügbaren Inhalte urheberrechtlich geschützt sind und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die Website befindet sich im Aufbau und wird laufend mit zusätzlichen Inhalten und Updates erweitert.

WAS SIE ERWARTET


Wir freuen uns, Ihnen einige Beispiele und Einblicke in die Inhalte unserer Website geben zu können. Die zusätzlichen Informationen für Gesundheitsfachpersonen sind grün markiert:

	Factsheet	Flyer	Infosheet	MAP	Bookmark
- Abdominaltyphus					
+ Wesentliche Aspekte					
+ Abdominaltyphus - Karte					
+ Abdominaltyphus - Informationsblatt					
+ Dokumente für Gesundheitsfachkräfte					


Karten

Nutzen Sie für die Beratung Ihrer Kunden neben anderen Karten auch unsere 8 regionalen Malariakarten! Die HealthyTravel PRO Version bietet detaillierte Karten mit Empfehlungen zur Malariaprophylaxe, inklusive Landmarken wie Städte, Flüsse und Nationalparks, die Ihre reisemedizinische Beratung erleichtern.

Weltkarte für den öffentlichen Gebrauch:



Beispiel für eine detaillierte Regionalkarte:





Flyer, Infobl tter und SOP f r Impfungen

Hier finden Sie Factsheets, die in Laiensprache f r die  ffentlichkeit verf gbar sind. Auf der PRO Version von www.healthytravel.ch bieten wir dar ber hinaus Flyer, Infobl tter und «Standard Operating Procedures» (SOP) f r Impfungen mit zus tzlichen Informationen und Expertenmeinungen f r unsere Gesundheitsfachpersonen an, die bei der Beratung verwendet werden k nnen.

MALARIA PREVENTION / PROPHYLAXIS

Key Points

- Malaria is the threatening infectious...
- Start on prophylaxis 1-2 weeks before...
- High-risk areas: see recommendations...
- For stops in low-risk areas: discuss with...
- From being in a special risk group...
- Consultation with a travel medicine...
- After the trip: see a travel physician...
- After the trip: see a travel physician...

Worldwide occurrence of malaria

How can I protect myself?

Malaria prevention requires a combination of:

- Chemoprophylaxis
- Personal protection
- Chemoprophylaxis in recommended areas
- Carrying a malaria emergency treatment

INFORMATIONSBLETT HEPATITIS A

Einleitung

Hepatitis A-Virus, ein h ufiges RNA-Virus, verleiht zur Familie der Flaviviraceae geh rt. Menschen sind die einzige nat rlichen Wirt, und werden bei Infektion...

Risiko

Die Infektion tritt vorwiegend in Entwicklungsl ndern bis hin zu hohem Hepatitisrisiko. Der Erwerb von Hepatitis A-Virus erfolgt durch Kontakt mit dem Stuhl einer infizierten Person. In den Industriel ndern tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel auf. In den Tropen und Subtropen tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser auf. In den Tropen und Subtropen tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser auf.

Diagnose

Bestimmte Nachweisverfahren gegen das Hepatitis A-Virus sind die Untersuchung von Blut und Urin. Die Untersuchung von Blut und Urin ist die Untersuchung von Blut und Urin. Die Untersuchung von Blut und Urin ist die Untersuchung von Blut und Urin.

Vorbeugung

Die Infektion tritt vorwiegend in Entwicklungsl ndern bis hin zu hohem Hepatitisrisiko. Der Erwerb von Hepatitis A-Virus erfolgt durch Kontakt mit dem Stuhl einer infizierten Person. In den Industriel ndern tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel auf. In den Tropen und Subtropen tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser auf.

Impfung

Die Infektion tritt vorwiegend in Entwicklungsl ndern bis hin zu hohem Hepatitisrisiko. Der Erwerb von Hepatitis A-Virus erfolgt durch Kontakt mit dem Stuhl einer infizierten Person. In den Industriel ndern tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel auf. In den Tropen und Subtropen tritt die Infektion vorwiegend durch kontaminiertes Wasser auf.

Hepatitis A

Vaccination	Primary vaccination	Booster vaccination	Protection	Comments
Havrix® 1440 Havrix® 720	Children 1 year until 16 years* Havrix® 720 single dose Havrix® 1440 single dose	Only necessary if travelling to an endemic country: 2nd dose (IG-1) 12 months after the 1st dose (higher antibody titer if booster dose is given at 12 instead of 6 months)	• Seroconversion rate 30 days after primary vaccination: 95% • Lower and later seroconversion in the elderly. • After 2nd dose: lifelong protection.	Remarks to special points within the SOP: • Hep A vaccine is the most important/relevant travel vaccination! • Incubation period of Hep A is longer than the time to develop vaccine-induced immunity. If even last-minute exposure vaccination (until day 7 after exposure [1]) is effective. • Natural infection confers life-long immunity; asymptomatic "Hepatitis" in the past may not have necessarily been caused byHAV. (Unless past Hep A infection has been laboratory confirmed: vaccinate the person!) • Doing antibody testing in an observation, but not cost-effective. Note: Patients who were born/grew up in sub-Saharan Africa (at least until the age of 15) do not need to be vaccinated as the seroprevalence in this population is 95-100% [1]. • Hep A vaccine was introduced in 1992 (at that time in a series of 3 doses of 720). An Hep A vaccination documented before 1992 was possible immunisation with immunoglobulins which must not be counted as active immunisation dose!
Epaxal®	no longer available			
Hepatitis A (VATMA®)	combination vaccines of Hep A + Typhoid fever, available in some countries			
Dose: Havrix® 720: 0.5 mL Havrix® 1440: 1 mL Application: Im.	consider to administer a double vaccine dose at primary vaccination: priming with a double vaccine dose showed significant higher seroconversion rates in rheumatoid arthritis patients treated with TNFi and/or MTX [5]. This must likely applies to all patients receiving immunosuppressive drugs or being immunocompromised due to other medical conditions. * ECTM recommendation: administer a double vaccine dose as primary vaccination, consider to measure antibody titer 4 weeks after the doses.	• Schedule, see above. • consider to measure antibody titer 4 weeks after the dose • consider a serological control every 2 years before possible exposure as vaccine-induced immunity may fade fast in these patients. None! • 1 primary vaccination was conducted before immunosuppression, boosting under immunosuppression is usually effective • 1 primary vaccination was conducted while immunosuppression was already in place, booster doses are less effective: measurement of antibody titer is recommended [1]	• Seroconversion rate 2 months after double dose primary vaccination: 85% [1] • Seroconversion rate after booster 6 months: 82-95% [1] None! • depends on the kind of immune-suppression Indications: • All travellers going to tropical and subtropical countries. • Risk groups: • Patients with underlying chronic liver disease. • Men having sex with men (MSM): increased risk of sexual transmission in MSM communities is frequently reported. • Persons with Lx, drug abuse and persons with work-related contact to Lx, drug addicts; sewerage workers/work-related contact to wastewater; persons with close contact to migrants/refugees. Adverse events [4]: • Very frequent (1-17.0): • Children: irritability; adults: headache. • All age groups: pain, local erythema and/or induration at injection site. Absolute contraindications: • Presence of a severe allergic reaction, past hypersensitivity to the vaccine, known allergy to one of the vaccine ingredients. Pregnancy: • Pregnant women can be vaccinated when indicated (risk/benefit assessment). Breastfeeding: • Negligible risk.	

Last updated: 01.02.2022

WIE SIE SICH REGISTRIEREN

Um HealthyTravel PRO zu nutzen, bitten wir Sie, Ihr gew nschtes Abonnement auf der Webseite auszuw hlen und zu beziehen (<https://www.healthytravel.ch/payment-plans/>). Sobald die Zahlung erfolgt ist, ist der Inhalt umgehend zug nglich.

Payment Plans

Licence for 1 Login **CHF 244**

- Use of professional content
- Access to SOP
- Detailed maps
- Valid for 1 year
- Can be used for consultations

Subscribe Now

Licence for up to 6 Logins **CHF 699**

- Use of professional content
- Access to SOP
- Detailed maps
- Valid for 1 year
- Can be used for consultations

Subscribe Now

Licence for up to 10 Logins **CHF 999**

- Use of professional content
- Access to SOP
- Detailed maps
- Valid for 1 year
- Can be used for consultations

Subscribe Now

Licence for more than 10 Logins

- Use of professional content
- Access to SOP
- Detailed maps
- Valid for 1 year
- Can be used for consultations

Contact Us

Wenn Sie ein Gruppen-Abonnement oder eine Lizenz f r mehr als 10 Mitglieder erwerben m chten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@healthytravel.ch, um die Aktivierung zu koordinieren. Alle Abonnements sind f r 1 Jahr g ltig und k nnen bequem per Kreditkarte bezahlt werden.

WEITERE FRAGEN?

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, z gern Sie bitte nicht, uns auf info@healthytravel.ch zu kontaktieren! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Mit den besten Gr ssen,
Ihr HealthyTravel Team

Betrieben durch:
Schweizerische Expertenkommission f r Reisemedizin (EKRM)
ein Organ der
Schweizerischen Fachgesellschaft f r Tropen- und Reisemedizin FMH
Socinstrasse 55, Postfach, 4002 Basel

