

Aspetti principali riassunti in breve

- La malattia invasiva da meningococco (MIM) è un'infezione molto grave e pericolosa per la vita che, se non trattata, può condurre alla morte nel giro di poche ore.
- La trasmissione avviene da persona a persona tramite goccioline. Il rischio è maggiore per chi viaggia in regioni con epidemie stagionali (cintura della meningite nell'Africa sub-sahariana).
- La malattia può essere prevenuta con il vaccino meningococcico quadrivalente (MenACWY) la cui protezione dura almeno 5 anni.

Agente infettivo / Malattia

La malattia invasiva da meningococco (MIM) è un'infezione molto grave e pericolosa per la vita causata dal batterio *Neisseria meningitidis*. I pazienti affetti presentano generalmente una febbre improvvisa elevata, brividi e mal di testa, seguiti rapidamente da altri sintomi come eruzioni cutanee, nausea, vomito, stanchezza o confusione. È necessario un intervento medico tempestivo e la somministrazione rapida di un trattamento antibiotico.

Epidemiologia / Aree di rischio

Le infezioni da meningococchi si registrano in tutto il mondo. L'incidenza maggiore si osserva durante le epidemie stagionali nella stagione secca (dicembre - giugno) nella cosiddetta "cintura della meningite" nell'Africa subsahariana. Esiste anche un rischio maggiore di infezione in situazioni di sovraffollamento o di contatti stretti con molte persone, in particolare con i partecipanti ai pellegrinaggi Hajj o Umrah in Arabia Saudita. Tutti possono essere infettati, ma i bambini piccoli e le persone con determinate condizioni mediche o terapie (ad esempio, milza non funzionale o assente) sono più a rischio di sviluppare delle infezioni da meningococchi.

Trasmissione

La trasmissione avviene da persona a persona tramite goccioline, principalmente attraverso il contatto personale ravvicinato, come la convivenza o il bacio.

Sintomi

Le principali manifestazioni della malattia sono la meningite o la setticemia (infezione del sangue). I pazienti presentano all'improvviso febbre, mal di testa e malessere, rapidamente seguiti da altri sintomi come torcicollo, dolore agli arti, eruzione cutanea, confusione, diarrea e vomito. Le infezioni da meningococchi sono molto gravi e possono provocare il decesso nel giro di poche ore.

Trattamento

I pazienti richiedono un'assistenza medica tempestiva e un trattamento antibiotico veloce per via endovenosa. Possono presentarsi complicazioni gravi, abbassamento della pressione sanguigna, convulsioni o necrosi dei tessuti, che richiedono trattamenti specifici.

Prevenzione

Per i viaggiatori in regioni epidemiche e per le persone con fattori di rischio, la vaccinazione è il modo migliore per prevenire lo sviluppo di malattie invasive da meningococchi. Una dose di vaccino coniugato quadrivalente ACWY (MenACWY ad esempio Menveo®, Menquadfi®) protegge dalla maggior parte delle infezioni da meningococchi a partire da 7-10 giorni dopo la vaccinazione. La protezione dura per almeno 5 anni e i vaccini sono autorizzati in Svizzera a partire dall'età di due mesi (Menveo®) e 12 mesi (Menquadfi®). Al di sotto dei 12 mesi di età, può essere utilizzato solo Menveo®, ed è indicato uno schema a tre dosi. In caso di esposizione ricorrente o di rischio continuo, si raccomanda una dose di richiamo ogni 5 anni. Per i pellegrinaggi in Arabia Saudita (Hajj / Umrah) il vaccino contro i meningococchi ACWY è obbligatorio (dose di richiamo ogni 3-5 anni, a seconda del tipo di vaccino). Il vaccino è ben tollerato; possono manifestarsi effetti indesiderati transitori come febbre, dolore al sito di iniezione, mal di testa o stanchezza, ma scompaiono da soli entro pochi giorni dalla vaccinazione.

Maggiori informazioni

La vaccinazione contro i meningococchi ACWY è raccomandata in Svizzera come vaccinazione complementare per i bambini tra i 1 e i 4 anni e per gli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni. Inoltre, è raccomandata come vaccinazione di gruppi a rischio come le persone con determinate condizioni mediche, le persone a stretto contatto con un paziente che presenta un'infezione da meningococchi e i viaggiatori che si recano in zone epidemiche.

Per informazioni più dettagliate sulla malattia e sulle raccomandazioni nazionali svizzere (in tedesco, francese e italiano) si veda:

- <https://www.bag.admin.ch/it/malattie-invasive-da-meningococchi> o
- <https://www.infovac.ch/it/vaccinationi/per-le-malattie/meningococchi>